

ACS (Akutes Koronarsyndrom)

[A1] Hören Sie das Audio und ergänzen Sie die fehlenden Begriffe.

Ich berichte über einen 62-jährigen Patienten, der sich bei uns vorstellte, wegen _____¹ 90 Minuten _____² Thorakalgien mit Ausstrahlungen in Unterkiefer und den linken Arm. Schmerzintensität sei 9 von 10, die Schmerzen _____³ in Ruhe _____⁴ und seien begleitet von kaltem Schweiß. Nausea ohne Vomitus und Todesangst. Zudem berichtet der Patient über ein _____⁵ sechs Monaten bei Belastung _____⁶ retrosternales Druckgefühl mit Schmerzintensität 3 von 10. Und diese Schmerzen seien nach zwei bis drei Minuten in Ruhe abgeklungen. Seit einer Woche habe der Patient eine Zunahme dieser Episoden bemerkt und sie würden bei geringerer Belastung auftreten und hätten eine größere Schmerzintensität.



AUDIO

[A2] Konjunktiv-I, Konjunktiv-II, Indikativ: Kreuzen Sie an.

A = Konjunktiv-I, B = Konjunktiv-II, C = Indikativ	A	B	C
1. Schmerzintensität sei 9 von 10.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Die Schmerzen seien in Ruhe aufgetreten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Zudem berichtet der Patient über ein Druckgefühl.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Der Patient habe eine Zunahme bemerkt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Sie würden bei geringerer Belastung auftreten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Sie hätten eine größere Schmerzintensität.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[A3] Temporalpräpositionen: Ordnen Sie zu.

unter, seit, vor, für, zu, an, seit

- Der Patient habe _____ 46 Jahre geraucht.
- Er habe _____ 8 Jahren aufgehört Zigaretten zu rauchen.
- Er trinke _____ seinem MI vor 5 J. _____ der Woche keinen Alkohol mehr.
- _____ der Patient Sport treibt, geht es ihm besser.
- Aber _____ Wochenende trinke der Patient regelmäßig 2-3 Liter Bier.
- Und _____ Frühstück trinke der Patient bis zu 4 Tassen Kaffee.



LÖSUNGEN

[A4] Verdachts- und Differentialdiagnosen: Ordnen Sie zu (achten Sie auf die passende Form).

sprechen (für/gegen), typisch sein (für/bei), ausgehen (von), sich handeln (um), ein Hinweis sein (auf), hindeuten (auf)

1. Aufgrund der Symptome _____ ich von akutem Koronarsyndrom aus.
2. Alle Symptome _____ auf diese Diagnose hin.
3. Die Ausstrahlung der Schmerzen _____ für eine kardiologische Ursache.
4. Es könnte sich auch um eine gastroenterologische Erkrankung _____ .
5. Häufiges Sodbrennen kann ein _____ auf Refluxkrankheit sein.
6. Brustschmerzen bei Belastung sind _____ für/bei Herzerkrankungen.

[A5] Passiv mit Modalverb: Bilden Sie die Partizip-II-Formen und ordnen Sie zu.

besprechen, durchführen, beseitigen, aufklären, einsetzen, bestimmen

1. Der Patient muss über das weitere Vorgehen _____ werden.
2. Es muss sofort ein EKG _____ werden.
3. Auch die Laborparameter müssen so schnell wie möglich _____ werden.
4. Verschiedene Medikamentengruppen können zur Therapie _____ werden.
5. Falls ein Thrombus vorliegt, muss dieser _____ werden.
6. Mit dem Patienten sollten eventuell weitere Lebensstiländerungen _____ werden.

[A6] Fachbegriffe: Schreiben Sie die umgangssprachlichen Begriffe.

01. Embolus
02. Kardiomyopathie
03. Arteria femoralis
04. Palpitation (Palpitationen)
05. Claudicatio
06. Perikard
07. Aorta
08. Thrombose
09. Stenose
10. Myokarditis
11. Schock (vaskulär)
12. Endokard



[AX] Mündliche Präsentation: Präsentieren Sie die Informationen, nutzen Sie Wortschatz/Grammatik aus den Übungen.

[A1] Patientenvorstellung

Pat. 62. J.

seit 90 min bestehend: Thorakalgien + Irr. → Unterkief., li Arm | 9/10, i.R. aufgetreten
+ Kaltschweiß, Nausea ~~Vomitus~~, Todesangst

seit 6 Mo: b. Belastung: retrostern. Druck. | (3/10), abklingen i. R. (2-3 min)

seit 1 Wo: Zunahme (frequenz, SI) geringe Belastung

[A3] Temporalpräpositionen

für 46 Jahre geraucht, vor 8 Jahren aufgehört

seit MI kein Alk unter der Woche

am WE 2-3 L Bier

Zum Frühstück 4 T. Kaffee

[A4] Verdachts- und Differentialdiagnosen

ausgehen von (ACS)

hindeuten auf (Symptome > diese Diagnose)

sprechen für (Ausstrahlung > kardiologische Ursache)

sich handeln um (gastroenterologische Erkrankung)

ein Hinweis sein auf (Sodbrennen > GERD)

typisch sein für/bei (Brustschmerzen > Herzerkrankungen)

[A6] AAG: Passiv mit Modalverb

aufklären (weiteres Vorgehen)

durchführen (EKG)

bestimmen (Laborparameter)

einsetzen (Medikamentengruppen)

beseitigen (Thrombus)

besprechen (Lebensstiländerungen)